

Tableau 16-III Suivi biologique de la personne exposée aux virus VIH, VHC, VHB (circulaire 2003)

	AES traité	AES non traité	Exposition sexuelle traitée	Exposition sexuelle non traitée
J0	NFS, ALAT, amylase, créatinine, Test de grossesse Sérologie VIH, VHC, Anticorps anti-HBs si vacciné sans taux connu	Sérologie VIH, Sérologie VHC +ALAT Anticorps anti-HBs si vacciné sans taux connu	NFS, ALAT, amylase, test de grossesse, sérologie VIH, Anticorps anti-HBs ou dépistage par anti-HBc. TPHA, VDRL	Sérologie VIH Anticorps anti-HbS si vacciné sans taux connu ou dépistage par anti-HBc. TPHA VDRL
J15	NFS, ALAT, créatinine si ténofovir PCR VHC si PCR + chez sujet source	- PCR VHC si PCR + chez source	NFS, ALAT, créatinine si ténofovir	Pas de bilan biologique
J30	NFS, ALAT, Sérologie VHC si risque VHC	Sérologie VIH ALAT + Sérologie VHC	NFS, ALAT, TPHA/VDRL selon risque	Sérologie VIH TPHA/VDRL selon risque
M2	Sérologie VIH	Pas de bilan biologique	Sérologie VIH	Pas de bilan biologique
M3	Pas de bilan biologique	Sérologie VIH sérologie VHC et ALAT	Pas de bilan biologique	Sérologie VIH Anti-HBc si non répondeur ou non vacciné
M4	Sérologie VIH Sérologie VHC et ALAT si risque VHC	Pas de bilan biologique	Sérologie VIH Anti-HBs ou anti-HBc	
M6	Sérologie VHC et ALAT Anti-HBc si non répondeur ou non vacciné	Sérologie VHC et ALAT Anti-HBc si non répondeur ou non vacciné		

N.B. : En cas d'apparition de symptômes évocateurs d'une primo-infection par le VIH, il est recommandé de faire pratiquer une sérologie VIH et une charge virale VIH, quelle que soit la date.