


Hélène Donnadiou, Catherine Quillet, Nicolas Nagot, et équipe d'ICÔNE ANRS



Introduction



France: Prévalence < 0.4% en population générale


Elimination de l'hépatite C (Objectif OMS 20230)
• Diminution de 90% des nouvelles infections et
et Réduction de 65% de la mortalité liée au VHC

(plan national priorité prévention 2018-2022, Polaris observatory (cda found))

Recommandations de l'AFEF

- Cibler les populations vulnérables/cachées du soin
 - Personnes qui utilisent des drogues (PQUD)
 - Personnes en situation de migration
 - Personnes incarcérées
 - Personnes suivies en santé mentale

Favoriser l'aller-vers/Micro-élimination/Techniques innovantes



• *Lieu éphémère de recherche en dehors du soin classique*


Méthodes

- Technique innovante de recrutement des populations cachées
 - Technique de Respondant-Driven Sampling (Heckathorn 1996)
 - Double incitation à la participation
 - Financière pour participer et pour recruter
 - Recrutement par des pairs (système en boule de neige avec des coupons)
- « Test to Treat » sur le lieu de recherche
- Implication de pairs employés à tous les stades de l'accompagnement

• Initiation par un premier groupe de « graines »

• Chaîne de recrutement par les participants eux-mêmes via des coupons de recrutement

• Indemnisation financière (participation + recrutement)



• Recrutement Innovant : indemnisation financière pour participer à la recherche et pour recruter d'autres participants
= Pour acheter des substances ?

• Implication active de pairs usagers à chacune des étapes de la recherche

- Copil, étude, accompagnement, valorisation
= Embauchés car utilisation actuelle ou passée de substances illicites
= Action pénalisée en France qui permet d'accéder à un emploi


Résultats

Consommations de substances recueillies par les pairs employés = Données robustes en population

554 personnes incluses en 11 semaines

- 75% en situation de grande précarité
- 75 % n'avait pas consulté en addictologie l'année précédent l'étude

Categorie	Tous (N=554)	Consommation par voie IV (N=194)
	N (%)	N (%)
COC (cocaïne)	346 (62.5)	110 (56.7)
MOR (heroin, morphine)	251 (45.3)	103 (53.1)
MDMA (Ecstasy)	30 (5.4)	8 (4.1)
MET (methamphetamine)	46 (8.3)	25 (12.9)
AMP (amphetamines)	74 (13.4)	21 (10.8)
MTD (methadone)	192 (34.7)	87 (44.8)
BUP (buprenorphine)	165 (29.8)	86 (44.3)
KET (ketamine)	25 (4.5)	7 (3.6)
MDP (methylphenidate)	79 (14.3)	48 (24.7)
MCAT (cathinone)**	20 (3.6)	10 (5.2)



Guérison de plus de la moitié des personnes qui n'étaient pas dans le soin avant ICONE

Conclusions: Icône 1: preuve de concept

Efficacité de la technique de recrutement

Pertinence majeure de l'implication des pairs

